

**PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO
ENFERMAGEM DGAPS**



Procedimento: Cauterização química de granuloma periestomal com ácido tricloroacético a 50%	Nº: 26
	Data da elaboração: 15/04/2017 Enf Estomaterapeuta Rosaura Soares Paczek- Coren RS 33702 Enf Luísa Zadra Passberg- Coren RS 537387
	Data da última revisão: 08/07/2019 Roberto Bauer De Borba COREN RS 292218 Heloisa Duarte COREN RS 137670 Enfermeiras Distritais
Responsável pela execução: Enfermeiro estomaterapeuta	Aprovação: Enf Fabiane Soares de Souza - COREN 101011
Definição: Processo de regressão e remoção, por meio da cauterização química com ácido, de pequenos grânulos de tecido conjuntivo formados ao redor de estomas a partir de respostas inflamatórias ao material de sutura ou retenção do mesmo. Deverá ser realizado em pacientes que apresentam granulomas periestomais, uma vez por semana até completo desaparecimento do mesmo.	
Local de realização: Serviço de Estomaterapia ou domicílio.	
Registro do procedimento: Evolução de enfermagem no prontuário do usuário e no boletim diário de atendimento (BDA). O registro pode também ser realizado fotograficamente, a partir do aceite e assinatura do termo de autorização de imagem pelo usuário. Dessa forma, o completo registro auxiliará o enfermeiro no acompanhamento do processo de regressão e remoção do granuloma periestomal.	
Material necessário: • Luvas de procedimento; • Solução para limpeza da pele periestomal ou água e sabão neutro; • Gazes; • Frasco contendo ácido tricloroacético a 50%; • Material para aplicação do ácido, como cotonetes ou swab; • Materiais específicos para proteção da pele periestomal, como	

pastas; • Bolsas coletoras para estomias.

Descrição do procedimento:

- Reunir o material necessário para o procedimento;
- Identificar o usuário;
- Explicar o procedimento a ser realizado;
- Lavar as mãos (POP 01);
- Calçar as luvas;
- Retirar o equipamento coletor aplicado no estoma;

- Realizar a higienização da pele periestomal com gazes embebidas em solução destinada a limpeza de estomas ou com água morna e sabão neutro;
- Despejar, com cuidado, pequena quantidade de ácido na ponta do cotonete ou do swab;
- Aplicar o ácido em cada granuloma, durante alguns segundos, até que o mesmo se torne esbranquiçado;
- Proteger a pele periestomal, inclusive os granulomas, com pasta protetora;
- Colocar nova bolsa coletora;
- Fechar o clamp da bolsa coletora;
- Desprezar o material utilizado em local apropriado;
- Retirar as luvas;
- Lavar as mãos;
- Registrar o procedimento no prontuário do usuário.

Observações:

Durante o processo, pode ocorrer relato de ardência, que ocorre devido à aplicação do ácido tricloroacético.

Resultado esperado:

Remoção completa dos granulomas periestomais.

Referências bibliográficas:

COFEN. **Parecer Nº 33/2014/COFEN/CTLN.** Solicitação de profissionais referente legalidade da aplicação de ácido tricloroacético na concentração de 50 à 80% em lesões condilomatosas, por enfermeiros. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/parecer-no-332014cofenctl_n_28209.html>. Acesso em: 15 abr. 2017.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA (SBD). **Cauterização Química.** 2016. Disponível em:

<<https://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/procedimentos/cauterizacao-quimica/2/>>. Acesso em: 15 abr. 2017.

YAMADA, B. F. A.; PERES, C. S. V.; SANTOS, V. L. C. G. Granuloma em Gastronomia: Uma Alternativa Inovadora de Tratamento Tópico. *Revista da Associação Brasileira de Estomaterapia: estomias, feridas e incontinências*, v. 2, n. 4, 2004.

ZULKOWSKI, K. Ostomy terms and definitions. *The World Council of Enterostomal Therapists Journal (WCET)*, v. 35, n.3, July/september 2015. P. 48-50.