

NOTA INFORMATIVA

VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR) COM A VACINA AREXVY

Data de publicação: 09/08/2024

ASSUNTO: Orientações de apoio para imunização contra o vírus sincicial respiratório (VSR) com a vacina Arexvy, da fabricante GSK, em pessoas com .

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA ORIENTAÇÕES OU CONSULTAS

- a. [Nota Informativa CEVS nº13/2024](#)
- b. [Bula vacina Arexvy, GSK.](#)

PÚBLICO-ALVO

1. Pessoas de 60 anos ou mais que estão em abrigos temporários ou em centros humanitários de Acolhimento (CHA);
2. E, conforme disponibilidade da vacina, idosos residentes em ILPI, preferencialmente, acima dos 70 anos.

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. **Apresentação:** frasco-ampola de pó liofilizado (antígeno RSVPreF3) e diluente em frasco-ampola de suspensão injetável (sistema adjuvante AS01E).
2. **Via de administração:** Exclusivamente intramuscular, de preferência no músculo deltoide.
3. **Volume da dose:** 0,5ml da solução reconstituída (pó + suspensão injetável).
4. **Reconstituição:**
 - a. Retirar todo o conteúdo do frasco-ampola que contém a suspensão com uma seringa.
 - b. Adicionar todo o conteúdo da seringa no frasco-ampola que contém o pó.
 - c. Agitar suavemente até que o pó esteja completamente dissolvido. A vacina reconstituída é um líquido opalescente, incolor a castanho claro.
5. **Esquema vacinal:** dose única.
6. **Conservação:** 2 a 8°C, uso imediato.
7. **Contraindicações:** Contraindicada nos casos de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer componente da vacina.

8. Precauções:

- a. OBSERVAÇÃO DO VACINADO por, pelo menos, 15 minutos após a vacinação.
 - b. A vacinação com *Arexvy* deve ser adiada em indivíduos que sofrem de uma enfermidade febril aguda severa. No entanto, a presença de uma infecção não grave, como resfriado, não deve resultar no adiamento da vacinação.
 - c. A administração simultânea com outras vacinas deve ser evitada, respeitando um intervalo de 24 horas.
9. **Registro:** Exclusivamente no Novo SIPNI, com perfil de **Operador Estabelecimento de Saúde**, estratégia rotina, dose única (DU).
10. **Farmacovigilância:** A farmacovigilância de vacinas e outros imunobiológicos é o processo de detecção, avaliação, compreensão, prevenção e comunicação de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI) ou de qualquer outro problema relacionado ao produto, ou sua administração. Neste sentido é fundamental a identificação e notificação oportuna dos casos de ESAVI, para avaliação e intervenções adequadas, quando necessário. Para notificação de ESAVI, utilizar o e-SUS Notifica no site <https://notifica.saude.gov.br/login>. Todos os ESAVI devem ser notificados, exceto reação local leve.