



FAIXAS ETÁRIAS PARA APLICAÇÃO DAS VACINAS

INDICAÇÃO	VACINA	IDADE LIMITE	
Ao nascer	Hepatite B (primeira dose do recém nascido)	30 dias	
2 meses	Rotavírus 1ª dose	3 meses e 15 dias	
4 meses	Rotavírus 2ª dose (somente se recebeu a primeira dose)	7 meses e 29 dias	
2 e 4 meses	Pneumo 10 (esquema básico)	11 meses e 29 dias	
3 e 5 meses	Meningo C (esquema básico)		
Ao nascer	BCG	4 anos, 11 meses e 29 dias	
2, 4 e 6 meses	VIP		
6 e 7 meses	COVID-19		
15 meses 4 anos	VOP (reforços)		
15 meses	Hepatite A		
	Tetra viral		
12 meses	Meningo C (reforço ou dose única)		
	Pneumo 10 (reforço ou dose única)		
2, 4 e 6 meses	Pentavalente		6 anos, 11 meses e 29 dias
15 meses	Varicela - 1ª dose (substituição do esquema com Tetra Viral)		
	DTP- 1ª dose de reforço		
4 anos	Varicela - 2ª dose (exceto profissionais da saúde)		
	DTP - 2ª dose de reforço		
11 anos	Meningo ACWY	14 anos, 11 meses e 29 dias	
9 anos	HPV - Dose única		
9 anos	HPV em imunodeprimidos (indicações: ver manual do CRIE)	45 anos, 11 meses e 29 dias	
9 meses 4 anos	Febre Amarela (≥ 60 anos apenas com liberação médica)	59 anos 11 meses e 29 dias	
12 meses	Tríplice Viral - 1ª dose (exceto trabalhadores da saúde)		
15 meses	Tríplice Viral - 2ª dose (exceto trabalhadores da saúde)		

Atualização Junho/ 2024



**Prefeitura de
Porto Alegre**
SECRETARIA DE SAÚDE